

PASTILLAS FALSIFICADAS



¿QUÉ SON?

Las pastillas falsificadas no son medicamentos auténticos. Pueden contener fentanilo o metanfetamina y son extremadamente peligrosas, ya que a menudo tienen un aspecto idéntico al de las pastillas recetadas auténticas.

¿CUÁL ES SU ORIGEN?

Las pastillas falsificadas suelen fabricarse en condiciones deficientes, están mal etiquetadas y pueden contener sustancias peligrosas e incluso mortales. Las ventas online a través de plataformas de comercio electrónico y redes sociales constituyen las principales vías de adquisición de pastillas falsificadas.

¿QUÉ ASPECTO TIENEN?

Las pastillas falsificadas son prácticamente idénticas a los medicamentos recetados. Pueden parecerse a la oxicodona, el alprazolam (Xanax), el Adderall y otros medicamentos. Los estudiantes pueden adquirir Xanax para tratar la ansiedad y Adderall con la creencia de que les ayudará en sus estudios, y muchas de estas compras se realizan a través de Internet o de las redes sociales. Muchos de estos sitios web venden versiones falsificadas de estos medicamentos contaminadas con fentanilo o metanfetamina, lo que puede provocar la muerte.



30 mg de oxicodona
auténtica (izquierda)
y falsificada (derecha)



Una dosis letal de fentanilo

¿QUÉ EFECTOS TIENEN EN EL ORGANISMO?

Las pastillas falsificadas que contienen fentanilo pueden ser mortales. Una dosis letal de fentanilo es de unos dos miligramos, lo que equivale al tamaño de unos pocos granos de sal.

Las pastillas falsificadas que contienen metanfetamina son altamente adictivas y actúan sobre el sistema nervioso central. El consumo de incluso pequeñas cantidades de metanfetamina puede provocar insomnio, aumento de la actividad física, pérdida de apetito, respiración y frecuencia cardíaca aceleradas, arritmias cardíacas, aumento de la presión arterial e hipertermia (sobrecalentamiento).

¿CUÁLES SON LOS EFECTOS DE UNA SOBREDOSIS?

Una sobredosis de fentanilo puede provocar cambios en el tamaño de las pupilas, piel fría y húmeda, coma e insuficiencia respiratoria que puede provocar la muerte.

Una sobredosis de metanfetamina puede provocar la muerte por un accidente cerebrovascular, un infarto de miocardio o problemas en múltiples órganos causados por un aumento excesivo de la temperatura corporal.

La mejor manera de evitar los medicamentos falsificados es tomar únicamente aquellos que le haya recetado un profesional médico autorizado y que le haya dispensado un farmacéutico colegiado.

PARA OBTENER INFORMACIÓN SOBRE LA PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS, VISITE LOS SITIOS WEB DE LA DEA:

Para padres, cuidadores
y educadores
[GetSmartAboutDrugs.com](https://www.getsmartaboutdrugs.com)

Para jóvenes
[JustThinkTwice.com](https://www.justthinktwice.com)

Para campus universitarios
[CampusDrugPrevention.gov](https://www.CampusDrugPrevention.gov)

Para obtener más información
sobre las pastillas falsificadas
[dea.gov/onepill](https://www.dea.gov/onepill)