

FENTANILO



dea.gov

¿QUÉ ES EL FENTANILO?


El fentanilo legal es un fármaco opioide sintético que utilizan los hospitales y los médicos como analgésico y anestésico. Es 100 veces más potente que la morfina y 50 veces más potente que la heroína. El fentanilo ilegal se produce en laboratorios clandestinos, se mezcla habitualmente con otras drogas ilegales y se utiliza en pastillas falsificadas que imitan el aspecto de los medicamentos auténticos en forma de pastillas y comprimidos.

NOMBRES EN LA CALLE

Apache, Blues, China Girl, China Town, China White, Dance Fever, Dirty 30s, Freddie, Fent/Fenty, Goodfellas, Jackpot, M-30s, Murder 8, y Tango & Cash.

¿QUÉ ASPECTO TIENE?

El fentanilo ilegal puede presentarse en forma de polvo blanco, pero resulta indetectable cuando se mezcla con otras drogas o se comprime en pastillas falsificadas.



Pastillas falsificadas de oxicodona

¿CÓMO SE UTILIZA?

Aunque puede venderse por sí solo, el fentanilo de producción ilícita suele mezclarse de forma clandestina durante la fabricación de otras drogas ilegales, como la heroína, la cocaína, la metanfetamina, la marihuana, la MDMA y otras sustancias, y se ha detectado en pastillas falsificadas que imitan medicamentos como la oxicodona, el Xanax y el Adderall. El fentanilo puede inyectarse, esnifarse, fumarse, tomarse por vía oral en forma de pastilla o comprimido, y aplicarse sobre papel secante. Los parches farmacéuticos de fentanilo se utilizan indebidamente extrayendo su contenido



Una dosis letal de fentanilo

en gel y luego, inyectarse o ingerir dicho contenido. También se han congelado parches, se han cortado en trozos y se han colocado debajo de la lengua o en la cavidad bucal.

EFFECTOS EN EL CUERPO

El fentanilo es altamente adictivo, tanto a nivel físico como psicológico. El fentanilo, al igual que otros analgésicos opioides de uso común (por ejemplo, la morfina), produce efectos tales como relajación, euforia, alivio del dolor, sedación, confusión, somnolencia, mareos, náuseas, vómitos, retención urinaria, miosis y depresión respiratoria.

EFFECTOS DE UNA SOBREDOSIS

Tan solo 2 mg de fentanilo (unos pocos granos de sal) pueden constituir una dosis letal. Una sobredosis puede provocar estupor, alteraciones en el tamaño de las pupilas, piel fría y húmeda, cianosis, coma e insuficiencia respiratoria que conduzca a la muerte. La presencia de un trío de síntomas como el coma, pupilas puntiformes y depresión respiratoria es un indicio claro de intoxicación por fentanilo.

SALVE UNA VIDA

Las sobredosis o intoxicaciones por opioides pueden revertirse. Si se encuentra con una persona que presenta síntomas de sobredosis, llame siempre al 911 y adminístrele naloxona si dispone de ella.

PARA OBTENER INFORMACIÓN SOBRE LA PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS, VISITE LOS SITIOS WEB DE LA DEA:

Para padres, cuidadores
y educadores
[GetSmartAboutDrugs.com](https://www.getsmartaboutdrugs.com)

Para jóvenes
[JustThinkTwice.com](https://www.justthinktwice.com)

Para campus universitarios
[CampusDrugPrevention.gov](https://www.CampusDrugPrevention.gov)